

CANDIDATO A TRASPLANTE

INDICACIONES Y CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

- ☐ Enfermedad renal crónica con progresión proyectada a enfermedad renal en etapa terminal (ESRD) o una tasa de filtración glomerular estimada (eGFR) menor o igual a 20 ml/min.
- ☐ Capacidad para cumplir con las rutinas posparto o posteriores al trasplante, tomar los medicamentos y asistir a las citas, ya sea de forma independiente o con apoyo.
- ☐ Desea recibir un trasplante de riñón.

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS:

☐ Cáncer metastásico activo (esperanza de vida menor de 3 años). ☐ Infecciones activas o recurrentes. ☐ Afecciones graves con poca probabilidad de mejorar con el trasplante: ☐ Enfermedad coronaria grave o incorregible. ☐ Miocardiopatía (fracción de eyección menor de 30 %). ☐ Enfermedad pulmonar, enfisema o hipertensión pulmonar severa o incorregible (>50 mmHg). ☐ Enfermedad cardiovascular. ☐ Cirrosis descompensada grave. ☐ Hipotensión que requiere el uso diario de midodrina. ☐ Dependencia diaria de oxígeno en el hogar. ☐ Enfermedad vascular grave. ☐ Anemia de células falciformes (drepanocitosis). ☐ Hepatitis activa de cualquier tipo. ☐ Tercer trasplante.	☐ Incapacidad para cumplir con un régimen médico complejo (enfermedad psiquiátrica, incumplimiento activo, falta de apoyo social necesario). ☐ Incumplimiento con el tratamiento, en el plazo de los últimos 12 meses, en el caso de ser candidato a un retrasplante. ☐ Posibles complicaciones a causa de medicamentos inmunosupresores que son inaceptables para el paciente. ☐ Manía activa o síntomas psicóticos que podrían dificultar el cumplimiento con el tratamiento. ☐ Pérdida irremediable de fondos o seguro. ☐ Vivienda inestable. ☐ Incapacidad para comprender personalmente y manejar los tratamientos médicos (lo que incluye la incapacidad o la falta de voluntad para usar medicamentos, asistir a visitas de seguimiento y culminar el tratamiento o los estudios según lo recetado), o tener un cuidador para que le ayude a manejar dichos tratamientos. ☐ Abuso de sustancias vigente (que puede incluir medicamentos recetados, drogas ilegales y alcohol). ☐ Intento, planificación o pensamientos de suicidio.
--	--

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS:

☐ Múltiples comorbilidades médicas. ☐ Incapacidad para viajar de vuelta al centro de trasplantes. ☐ Pruebas diagnósticas incompletas. ☐ IMC >40 salvo en los siguientes casos: ☐ Edad < 65 años. ☐ Aprobación del cirujano. ☐ Alto nivel de funcionalidad. ☐ Ausencia de enfermedad arterial coronaria (CAD) o enfermedad vascular periférica (PVD). ☐ Cumplimiento de la dieta y de las recomendaciones nutricionales. ☐ Peso estable (±5 libras), sin incluir las fluctuaciones de líquidos. ☐ IMC inferior a 18. ☐ Evidencia de fragilidad. ☐ Enfermedad vascular periférica. ☐ Trastornos de hipercoagulabilidad. ☐ Lupus eritematoso sistémico (LES), siempre que: ☐ Se haya mantenido estable durante más de 6 meses. ☐ Requiera menos de 7.5 mg de prednisona al día. ☐ Requiera menos de 1000 mg de micofenolato mofetilo (MMF) al día en total. ☐ No presente manifestaciones extrarrenales activas.	☐ Infección por VIH salvo en los siguientes casos: ☐ Se mantenga estable con medicamentos antirretrovirales. ☐ Tenga una carga viral mínima o indetectable. ☐ No presente infecciones oportunistas. ☐ No presente infecciones oportunistas. ☐ Cirrosis. ☐ Tabaquismo y enfermedades asociadas. ☐ Neoplasia maligna (consulte el anexo A). ☐ Demencia (diagnosticado de manera oficial por un psiquiatra, neurólogo o geriatra). ☐ Servicios de atención limitados. ☐ Pérdida de un aloinjerto previo debido a falta de adherencia al tratamiento. ☐ Afección neurológica significativa. ☐ Problemas importantes relacionados con la adherencia médica actual o pasada. ☐ Dificultad percibida para colaborar con el equipo. ☐ Trastornos de la personalidad: grupo A (por ejemplo, paranoide, esquizotípico); grupo B (por ejemplo, antisocial, límite, narcisista).
--	---